

Novosti — Izkušnje — Pobude

STEDIRIL — oralni antikoncipiens

Stediril je nov preparat, ki ga izdeluje »KRKA«, tovarna zdravil v Novem mestu, s sodelovanjem Wyeth Laboratories, Philadelphia. Pripravek je nova kombinacija gestagena in estrogena.

Stediril zavira izločanje gonadotropinov iz sprednjega režnja hipofize, povzroča, da ovariji mirujejo in tako preprečuje ovulacijo.

Številne klinične izkušnje pri nas in v svetu so pokazale, da ob natančnem upoštevanju navodil za uporabo ni zanosila še nobena ženska. Zaradi izredno nizke doze aktivnih sestavin so sopojava zelo redki. Delovanje jajčnikov se normalizira že v prvem ciklusu zatem, ko ženska Stedirila ne jemlje več.

Klinični atest so napravili tudi v inštitutu za načrtovanje družine na kliniki za porodništvo in ženske bolezni v Ljubljani. Naj ga tule navedemo:

»Stediril smo dajali skupini 100 žensk, ki so imele do 31. 8. 1967 skupno 272 končanih ciklusov, od teh 2 po 7 oziroma 8 ciklusov, 5 žensk 6 ciklusov, 7 žensk 5 ciklusov, 25 žensk 4 cikluse, 19 žensk 3 cikluse, 9 žensk 2 ciklusa in 23 žensk le po 1 ciklus.

Redukcija fertilitnosti je stodontna, saj v 272 ciklusih ni zanosila nobena ženska. Deset žensk, ki so bile vključene v skupino, je prenehalo jemati Stediril v prvih ciklusih. Stiri so prenehale iz osebnih razlogov, šest pa zaradi sopojavov (od teh tri žene zaradi slabosti, ena zaradi neprijetnega občutka v želodcu in dve zaradi poslabšanja kožnih bolezni — psoriaze oziroma dermatitisa).

Kot pri drugih gestagenskih preparatih te vrste je tudi pri Stedirilu največ sopojavov v prvih treh ciklusih jemanja. To so navadno: navzea, izcedek iz nožnice, lažje krvavitve, glavobol in amenoreja.

Čeprav so naše izkušnje še skromne in preskušanje še ni končano, priporočamo uvedbo Stedirila pri nas iz dveh razlogov:

1. Stediril so preskušali v številnih klinikah in medicinskih centrih v zamejstvu (v ZDA, Angliji, Mehiki, ZR Nemčiji). Velja omeniti, da so preparat, preden je prišel v proizvodnjo, testirali na 2900 ženskah v 17.000 ciklusih in dosegli zelo ugodne rezultate. Nobena ženska ni zanosila, sopojavov pa je bilo znatno manj kakor pri doslej uporabljenih preparatih. Podatki navedenih preizkušanj so objavljeni v obširni literaturi, iz katere lahko povzamemo, da je Stediril zelo sprejemljiv in učinkovit oralni antikoncipiens.

2. Pri nas še nimamo na voljo preparata z nizkimi dozami gestagena. Iz kliničnih izkušenj vemo, da je bilo treba uporabljati preparat zaradi sopojavov pogosto zamenjati z drugim. Ker do sedaj nismo imeli dovolj primerne preparata, so ženske pogosto upustile oralno kontracepcijo. Zato bi bil preparat z nizko dozo gestagena, kot je Stediril, iz strogo medicinskih razlogov nadvse potreben.»

Podatki iz omenjenega atesta izvirajo iz časa, ko so preparat pri nas začeli uvajati. Od tedaj je v Inštitutu dobivalo Stediril 616 žensk, od katerih ga velika

večina še vedno jemlje. Rezultati so enaki kakor pred dvema letoma. Znano je, da enako uspešno uporablja Stediril veliko število žensk po vsej naši državi.

Med vrsto novosti, ki jih je dala na trg »KEMOFARMACIJA« — podjetje za promet s farmacevtskim materialom, vas tu seznanjamo še z naslednjimi zdravstvenimi pripomočki:

BLENDERM

Obliž za rane, z obeh strani neprepusten. Osnovna sestavina preparata je polieten. Bistvene prednosti so:

ne draži kože, odvrča mehanske nečistoče, prožen, prozoren, ne pušča ostankov lepila, prepušča rentgenske žarke, ne prepušča vode in zraka. Kombiniramo ga lahko z mikrodonom.

1 obroč ima 4,6 m traku.	1525	12 kd	2,5 cm šir.
1525/12 24 kd 1,1/4 cm šir.	1525/38	8 kd	3,3/4 cm šir.


ELASTIČNI POVOJ KOBAN

Ta povoj je nenavadno prožen. Izredno zanimiv je zaradi tega, ker lahko neomejeno dolgo ostane na rani. Deluje z adhezijo (adhezira sam sebe). Lahko ga steriliziramo (do 10-krat), ne da bi trpela prožnost. Uporabljamo ga pri raznih težkih operacijah, kilah, za imobilizacije, za luksacije, namesto elastičnih nogavic itd.

STERI — DRAPE

Sterilni polietilenski artikel fiksira kožne bakterije na koži, da je operacijsko polje do roba rane aseptično. Za različne kirurške posege je v prometu preparat z ustreznimi luknjami, ki pokrijejo operacijsko polje, oziroma v velikih sterilnih kosih. Preparat ima lepljivo površino, je neprepusten (za vodo itd.), prozoren, brez sijaja, sterilen in vzame zelo majhno površino. Rabimo ga predvsem v bolnišnicah, v prometu je v zavitkih po 10 kosov.

VREČKA ZA KOLOSTOMIJO



Vedno več je na terenu bolnikov, pri katerih je bil za zdravljenje potreben kirurški poseg **anus praeter**. Zato ne bo odveč, če tiste, ki delajo na terenu in na oddelkih za tovrstne operacije obvestimo o praktični in higienični vrečki

»COLOPLAST«, ki se dobi pri podjetju »SANOLABOR« v Ljubljani, Cigale-
tova 9.

»Coloplast«, vrečka za kolostomijo, se uporablja brez pasu, ima plastičen
obroč, ki se prilepi na kožo, in jo zlahka odstranimo. Na koži ne povzroči nobenega
vnetja, ker vsebuje posebno lepilo.

Vrečka je pakirana v polivinilskem ovitku, na katerem so tudi podrobna navo-
dila za uporabo (v nemščini). Dobi se v treh velikostih $7,5 \times 7,5$ cm, 9×10 cm in
 12×12 cm.

Po uporabi vrečko odvržemo, zato je priporočljiva zlasti za uporabo zunaj
doma.

Za isti namen pa ima podjetje »Sanolabor« naprodaj tudi vrečke s pasom —
klasičen tip —, ki so pri nas bolj znane, ker so že dalj časa v rabi.

